


FEUILLET 17 LES INCONNUS



LES INCONNUS

26,2 % des participants au sondage ne connaissaient pas leur statut VIH, puisqu'ils ont répondu n'avoir jamais eu un test de dépistage, ou pas récemment.



OÙ SONT-ILS?

Les hommes qui ne connaissaient pas leur statut VIH étaient plus susceptibles de vivre en région rurale ou dans de petites villes, que dans les grandes villes du Canada.

INCONNUS LIEUX DE VIE DES HOMMES QUI NE CONNAISSAIENT PAS LEUR STATUT VIH

20,3 %

Montréal, Toronto, Vancouver

37,9 %

Urbain, autre

41,8 %

Rural


CONNUS LIEUX DE VIE DES HOMMES QUI CONNAISSAIENT LEUR STATUT VIH

40,0 %

33,8 %

26,2 %





SEXUALITÉ

Il y avait des différences remarquables entre l'identité sexuelle des hommes qui ont répondu connaître ou ne pas connaître leur statut VIH.

HOMMES QUI NE CONNAISSAIENT PAS LEUR STATUT VIH

HOMMES QUI CONNAISSAIENT LEUR STATUT VIH

34,7 %	Gai	67,2 %
50,6 %	Bisexuel	25,7 %
5,6 %	Hétéro	2,7 %
9,1 %	Autre	4,4 %

RAISONS DONNÉES POUR NE PAS FAIRE DE DÉPISTAGE, PAR LES HOMMES QUI NE CONNAISSAIENT PAS LEUR STATUT VIH

Je pense que je suis séronégatif : 83,1 %

Le risque que je contracte le VIH est faible : 74,6 %

Je n'y ai jamais pensé : 33,9 %

Un résultat positif pourrait nuire à mes relations : 39,0 %

Je veux passer le test, mais je ne l'ai pas encore fait : 29,9 %

PAS CE SOIR,
J'AI MAL À LA TÊTE.

Je ne sais pas où aller pour passer le test : 22,9 %

Je serais incapable de composer avec un résultat positif : 22,0 %

J'ai peur que mon nom soit dévoilé : 18,6 %

Je préfère ne pas savoir : 17,0 %

RECOURS À DES SOINS DE SANTÉ

Les hommes qui ne connaissaient pas leur statut VIH ont utilisé moins souvent le système des soins de santé.



Recours à des soins dans les 12 derniers mois	Statut VIH inconnu	Statut VIH connu
Clinique sans rendez-vous	37,3 % OUI	52,1 % OUI
Médecin de famille	67,9 % OUI	74,9 % OUI
Médecin spécialiste	21,4 % OUI	42,1 % OUI
Infirmière/Infirmière praticienne	16,0 % OUI	34,1 % OUI

INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT (ITS) ET HÉPATITES

Les hommes qui ne connaissaient pas leur statut VIH ont déclaré moins d'hépatites et d'ITS.

	Statut VIH inconnu	Statut VIH connu
Oui, ITS (déjà eu)	15,2 %	35,1 %
Oui, toute hépatite (déjà eu)	2,0 %	9,8 %